



Tipps für die Verbesserung der Qualität ihrer Weihnachtsbäume

Schnittmaßnahmen:

Immer wieder kommt es vor, dass ein Trieb abbricht, oder die Terminalknospe nicht ausschlägt, so dass ein oder mehrere Seitentriebe die Funktion des Haupttriebes übernimmt und es zu Säbelwuchs kommt.

Hier gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten für Schnittmaßnahmen:

1. Alle Seitenäste abschneiden. Ein neuer Trieb wird im nächsten Frühjahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit austreiben. Vorsicht: die Seitenaststummel dürfen nicht kürzer als 4-5 cm sein, sonst stirbt möglicherweise die Terminale ab.



2. Einen schönen Seitenast als Reserve stehen lassen. Falls sich im kommenden Frühjahr in der ehemaligen Hauptknospe ein neuer Trieb bildet (Bild 2 unten), kann man diesen Seitenast entfernen. Andernfalls bringt man mit einem Stab den Seitenast in eine vertikale Ausrichtung (diese Maßnahme könnte man auch gleichzeitig mit dem Beschneiden durchführen).



3. Einen Seitentrieb hochbinden und den Baum im gleichen Jahr vermarkten, da er unseren ausgewählten Ast oft nicht akzeptiert und doch einen, oder mehrere andere Seitenäste als Haupttrieb ausbildet. Achtung: dies muss bis Ende Juli erfolgen, da der Trieb sich noch stabilisieren muss.



Triebe Stäben: krumme Terminale müssen durch Anbinden an einen Bambusstab in Form gebracht werden. Dies geht nur bis Ende Juli, je nach Witterungsverlauf. In dieses Jahr (2014) ist es früher.



Düngung Ende Juli-August: wer noch nicht genug Dünger im Frühjahr vergeben hat, muss die zweite Gabe jetzt planen. Bevorzugt wird mit Entec 24 gedüngt, oder als Mischung mit Patentkali oder auch Volldünger. Einige Firmen düngen sogar noch im September, da es schon vorgekommen ist, dass die Bäume, die im Oktober grün waren im Dezember die Farbe wechselten. Eine Stickstoffgabe in Form von Flüssigdünger kann ab September bis Oktober erfolgen. Diese dient in erster Linie für die Ausfärbung in Verkaufsbeständen. Stickstoff ist dann der einzige Wirkstoff, der von der Pflanze noch verarbeitet wird. Kritisch ist die Düngung in Beständen mit hohem Ph-Wert (ab 6,8) zu betrachten. Meiner Auffassung nach bringt hier konventioneller Dünger nicht viel, es wird nur Geld verbraten! Falls hier andere Erfahrungen vorliegen, bitte melden!

Anregungen, Fragen (Fotos) können jederzeit auch über WhatsApp 01777754006 erfolgen!

Pflanzung jetzt schon im August möglich? Ja!

Pflanzung von Topfpflanzen ist jetzt schon durchführbar,
wenn die Möglichkeit einer Bewässerung besteht.

Vorteil: das Hauptwurzelsystem beginnt jetzt, somit kann die Pflanze gleich in den eigentlichen Standort einwurzeln, und startet nächstes Jahr besser durch.



Sorten: [Nobilis](#), [Nordmann](#), [Frasertanne](#), [Blaufichte](#), Serbische Fichte, Koreatanne, [Küstentanne](#),
Schwarzkiefer (Coloradetanne braucht noch bis Ende September)

www.baumschulevogel.de/weihnachtsbaumpflanzen